


Fungizidstrategien im Weizen

Einmalbehandlung reicht bei geringem Befallsdruck¹⁾

1. Behandlung²⁾

Septoria tritici, Braunrost, DTR, Mehltau³⁾, Gelbrost, (Septoria nodorum)
 2,0 l Adecar
 2,5 l Ceriaz
 0,75 l Aviator Xpro + 0,75 l Fandango
 1,0 l Seguris + 1,5 l Amistar Opti/1,25 l Credo
 0,9 l Champion + 0,9 l Diamant
 1,5 l Amistar Opti oder 1,25 l Credo + 1,0 l Input Classic oder + 1,25 l Input Xpro oder + 1,25 l Opus Top oder + 2,5 l Eposion Top
 1,5 l Input Xpro
 1,25 l Skyway Xpro
 1,0 l Juwel Top
 1,25 l Input Classic
 2,5 l Eposion Top



1) bei geringem bis mittlerem Befallsdruck, bei wenig bis mittel anfälligen Sorten (z.B. Akons, Anapolis, Atomic, Acoma, Bonanza, Boregar, Colonia, Desamo, Bixer, Johnny, Kredo, Panier, Rebel, Spontan)

Quelle: LfL Bayern

2) bei späteren Behandlungen ist eine Verminderung der Aufwandmengen um etwa 30% möglich

3) bei stärkerem Mehltau-Befall zu Seguris + Amistar Opti/Credo oder zu Skyway Xpro als Mehltau-Ergänzung z.B. Q, 2 l Vegas oder Q6 l Corbel

Grafiken: Driemer

top agrar

In ausgeprägten Trockenjahren und in Anbaugebieten mit regelmäßiger Frühjahrstrockenheit genügt eine Fungizidmaßnahme.

Doppelbehandlung bei stärkerem Befallsdruck¹⁾


1. Behandlung

Mehltau³⁾, DTR, Septoria⁴⁾, Gelbrost⁵⁾, (Halmbruch⁶⁾)
 1,0 l Input Classic⁴⁾
 2,5 l Eleando⁴⁾
 2,0 l Kantik⁴⁾
 1,5 l Capalo⁴⁾
 0,2 l Vegas + 0,6 l Proline⁴⁾
 0,2 l Talus + 1,0 l Opus Top
 0,6 l Gladio (+ 0,6 kg Unix⁴⁾)
 2,0 l Eposion Top

2. Behandlung

Septoria tritici, Braunrost, DTR, Mehltau, Gelbrost, (Septoria nodorum)
 1,6 l Adecar
 2,0 l Ceriaz
 0,6 l Aviator Xpro + 0,6 l Fandango
 0,8 l Seguris + 1,2 l Amistar Opti/1,0 l Credo
 0,75 l Champion + 0,75 l Diamant
 1,5 l Amistar Opti oder 1,25 l Credo + 1,0 l Input Classic oder + 1,25 l Input Xpro oder + 1,25 l Opus Top oder + 2,5 l Eposion Top

1,25 l Input Xpro
 1,0 l Skyway Xpro
 1,0 l Juwel Top



1) bei mittlerem bis hohem Befallsdruck, bei mittel bis hoch anfälligen Sorten (z.B. Akteur, Cubus, Genius, Inspiration, JB Asano, Kerubino, Kometus, KMS Loft, Matrix, Ritmo, Rumor)

Quelle: LfL Bayern

2) zur vorgezogenen Mehltau-Bekämpfung bei sehr frühem Befallsdruck in EC 30-31 oder als Mehltau-Ergänzung zu Eleando: 0,2 l Talus, 0,2 l Vegas, 0,6 l Corbel


3) grundsätzlich Zugabe von 1,0 bis 1,5 l Bravo 500 bei Befallsdruck durch Septoria tritici

4) bei Gelbrostbefall Capalo, Eleando, Eposion Top, Kantik oder Opus Top bevorzugen, bei geringem Septoria-Risiko z.B. auch 1,2 l Cerabio, 1,0 l Rotaur, 1,2 l Orion oder Q4 l Ato 240 EC, 5) vorbehaltenlich der Zulassung ab EC 31 Mittel mit Halmbruch-Wirkung

top agrar

Grundsätzlich gewinnt man mit einem Aufteilen des Fungizidschutzes auf mehrere Behandlungen mehr Flexibilität.

Strategien einschließlich Ährenfusarien¹⁾



top agrar
 Grafik: Driemer

Platzieren Sie die Fusarium-Behandlung witterungsabhängig infektionsnah ab Beginn der Blüte.