

| Maissorten des mittespäten Sortiments ab S 260 | | | | Silomaisempfehlung | | | Mittel von Niedersachsen | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------|--------------------------|----------|--------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|---------|----------|----------|
| Sorte | Reifezahl | Vertrieb durch | im LSV seit | Nutzungsschwerpunkt | | | Ertragsmerkmale | | | | Qualitätsmerkmale | | | Blatfl. | Korn-typ | |
| | | | | Grasbetont | Maisbetont | Bio-gas | Abreife T % | TM dt/ha | Stärke dt/ha | GJ NEL/ha | MJ NEL/kg | Stärke % | Verdaulichkeit BSA | | | Toleranz |
| mehrfähig geprüfte Sorten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agro Vitalio | S 270 | Agromais | 2013 | | SNO | SNO | - | ++ | O | ++ | O | --- | - | O | Zw | |
| SY Campona | S 270 | Syngenta | 2014 | SNO | SNO | NO | - | + | O | ++ | + | --- | - | O | (H) | |
| ES Yeti | S 280 | Euralis | 2013 | | O | SO | --- | ++ | --- | ++ | - | --- | - | + | Zw | |
| Fauleen | S 280 | Advanta | 2013 | | O | SNO | - | +++ | --- | ++ | --- | --- | - | + | Zw | |
| ES Peppone | S 280 | Euralis | 2014 | | SNO | SNO | O | + | + | ++ | + | --- | O | + | Zw | |
| Ampatico KWS | S 270 | KWS | 2014 | | SNO | SNO | O | ++ | + | ++ | - | --- | - | O | Zw | |
| Atlas | S 280 | KWS | 2011 | | | SNO | O | ++ | - | + | --- | --- | O | O | Zw/(H) | |
| P 8213 | S 260 | Pioneer | 2013 | N | | | O | O | - | O | + | --- | O | O | (H) | |
| Danubio | S 270 | DSV | 2013 | O | | | - | O | - | O | + | --- | O | O | Zw/(H) | |
| SY Santacruz | S 270 | Syngenta | 2011 | SNO | | | - | - | O | O | ++ | + | + | + | Zw | |
| Palmer | S 290 | DSV | 2010 | | | SO | --- | + | --- | - | --- | --- | O | O | Za | |
| Sunmark/DS 0331 | S 270 | Saaten-Union | 2012 | S | | | O | --- | O | - | +++ | ++ | O | O | Zw | |
| Cascadinio | S 270 | KWS | 2013 | | | | O | O | O | + | + | O | + | + | (H)/Zw | |
| Perinio KWS | S 260 | KWS | 2013 | | | | O | O | O | + | - | - | - | - | (H)/Zw | |
| Sudrix/DS 0527 C | S 270 | Saaten-Union | 2014 | | | | O | O | O | O | O | O | O | O | (H)/Zw | |
| LG 3216* | S 260 | LG | 2009 | | | | + | O | O | O | O | O | - | - | Zw | |
| index* | S 270 | RAGT | 2013 | | | | - | O | O | O | O | O | O | O | H | |
| ES Fireball | S 270 | Euralis | 2012 | | | | - | O | --- | O | - | --- | - | O | (Za) | |
| LG 30306* | S 280 | LG | 2013 | | | | --- | + | --- | - | --- | --- | - | O | Za | |
| NK Silotop | S 270 | Syngenta | 2009 | | | | + | - | O | - | + | ++ | + | O | (Za) | |
| P 9027 | S 260 | Pioneer | 2012 | | | | O | - | - | - | --- | O | - | O | Za | |
| SY Bratisla ¹⁾ | S 260 | Syngenta | 2014 | NO | | | O | - | - | O | + | - | + | () | (H) | |
| ES Charter ¹⁾ | S 270 | Euralis | 2010 | N | | | - | O | - | O | + | - | O | O | Zw | |
| P 0745 ¹⁾ | S 320 | Pioneer | 2012 | | | SO | --- | ++ | --- | --- | --- | --- | - | + | Za | |
| einjährig geprüfte Sorten im LSV, für den Probeanbau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Walterino KWS | S 270 | KWS | 2015 | SNO | SNO | SNO | - | +++ | +++ | +++ | O | O | O | O | Zw | |
| Kilomeris | S 260 | KWS | 2015 | | | SNO | --- | ++ | O | + | --- | --- | - | O | Zw | |
| MAS 26 T | S 280 | Maisadour | 2015 | | | SO | --- | ++ | - | O | --- | --- | - | O | (H) | |
| Kantoros | S 260 | Agromais | 2015 | | | N | O | + | O | O | --- | - | O | O | Zw | |
| Farmgigant* | S 260 | Farmsaat | 2015 | SNO | | | + | - | ++ | O | ++ | +++ | O | + | Zw/(H) | |
| Corioil CS* | S 280 | Caussade | 2015 | | | | - | O | --- | - | - | --- | - | + | (H) | |
| P 8631 | S 270 | Pioneer | 2015 | | | | - | O | --- | - | --- | --- | O | - | (Za) | |
| P 9106 | S 280 | Pioneer | 2015 | | | | --- | O | --- | - | --- | --- | - | - | (Za) | |


S = Region Süd N = Region Nord O = Region Ost ¹⁾ = in 2015 nicht mehr geprüft
 * = EU-Sorte = Empfehlung für den Anbau 2016 = späte Abreife beachten
 Bewertungsschema: + = überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich
 Grasbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Stärkeerträge bzw. Energiekonzentration
 Maisbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energieerträge
 Biogas: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Trockenmasseerträge

Korn-typ: H = Hartmais Zw = Zwischentyp Za = Zahnmais
 (H) = hartmaisähnlich (Za) = zahnmaisähnlich

herausgegeben vom Geschäftsbereich Landwirtschaft
 Fachbereich Grünland und Futterbau
 Internet: <http://www.lwl-niedersachsen.de>
 November 2015
 Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers



Standorte LSV Silomais 2015 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen



- 1: Schoonorth
- 2: Borgholt
- 3: Ankelohe
- 4: Rockstedt
- 5: Lohne
- 6: Werlte
- 7: Bramstedt
- 8: Soltau
- 9: Obershagen
- 10: Königslutter
- 11: Poppenburg
- 12: Bad Gandersheim
- 13: Uslar