

Strategien gegen Pilzkrankheiten in Triticale

1. Behandlung

Bei frühem Befall Blattbehandlung splitten EC31 und EC33

nur Rost

Orius 0,6 oder Epoxion 0,5 oder Diamant 0,75
Nachlage ab EC 32 mit z. B. 1,5 Kantik/Viverda/Capalo

Rost und Mehltau

Ceralo 0,6 + Talius/Vegas 0,2
Nachlage ab EC 32 mit z. B. 1,5 Kantik/Capalo/Viverda oder 0,8 l/ha Juwel Top

zusätzlich Halmbrech

früh Unix 0,6 + Orius 0,3	ab EC 32	Gladio 0,6
früh Capalo 1,0	ab EC 32	Capalo 1,25
früh Kantik 1,25	ab EC 32	Viverda 1,75


2. Behandlung*

mit Fusariumrisiko z. B. Triticale nach Mais

Osiris 2,0 – 2,5
Input Classic 0,75 + Osiris 1,0
Aviator Xpro 0,6 + Osiris 1,25
Skyway 0,5 + Osiris 1,5
Input Classic ab 1,0

Osiris 1,5 + Ampera 1,0

top agrar Grafik: Driemer



* Behandlung, wenn 100% Ähren geschoben sind, unbedingt nach Niederschlägen

Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen

Passen Sie Ihre Fungizidstrategie an Standort, Witterung und Befallsdruck an.