

## Wachstumsregler-Strategien für Triticale

Behandlung in EC-Stadien		29–30	32–37	37–49
<b>sehr standfeste Sorten</b>				
Agendus, Agostino, Barolo, Dinaro, Grenado, Mikado, Sequenz, Silverado, Tantris	CCC	0,6–1,2		
	CCC Camposan <sup>1)</sup>	0,6–1,2		evtl. 0,2–0,4
<b>standfeste Sorten</b>				
Adverdo, Aveo, Lombardo, Talentro	CCC	0,8–1,5	0,4 + 0,25	
	CCC + Camposan <sup>1)</sup>			
	CCC	0,8–1,5		0,2–0,5
	Camposan <sup>1)</sup>			
	CCC	0,8–1,5	0,5	
CCC				
<b>Sorten, die man intensiver kürzen muss</b>				
Cosinus, Massimo, Rhenio, Securo, Tarzan, Tulus	CCC	1,25	0,5+0,25–0,4	0,3–0,6
	CCC + Camposan <sup>1)</sup>			
	CCC	1,0–1,75		0,3–0,6
	Camposan <sup>1)</sup>			
	CCC	1,0–1,75		0,4 +0,2
Camposan <sup>1)</sup> + Moddus				
1) Camposan durch Cerone austauschbar				

**Droht ein Bestand wegen später Mineralisationsschübe zu kippen, kann man bis spätestens zum Grannenspitzen nachkürzen.**