Sortenleistung SV-Rh 2016-2018				Rhizoctonia resistente Sorten
Sorten	Vertrieb	BZE SSV (ohne Rhiz. Befall) relativ[a]	abgestorbene Rüben bei Rhiz. Befall (SV-Rh 15-17) (%)	**BZE errechnet (bei Rhiz. Befall)** relativ[a]
Nauta	HIL	84,1	22,8	**107,8**
BTS 655	BTS	90,4	24,9	**104,7**
Taifun	BHIL	82,6	26,0	**103,1**
Breeda KWS[c]	KWS	86,7	28,7	**99,3**
Timur[2]	STR	89,8	31,7	**95,0**
Premiere[2]	STR	88,8	33,1	**92,9**
BTS 6000 RHC[b,e]	BTS	98,2	33,5	**92,3**
Rhinema[b,d,1t]	HIL	85,9	35,2	**89,9**
Isabella KWS	KWS	96,6	41,0	**81,6**
anfällige Sorte 1[3]		100,2	53,9	**63,1**
anfällige Sorte 2[3]		99,0	53,9	**63,1**

Quelle: IFZ verändert

[a] 100 = Verrechnungsmittel der Sorten Premiere, Nauta und Breeda KWS
[b] Daten Bonitur 2016 aus der WP Rz
[c] Daten Ertrag 2016 aus dem LNS
[d] Daten Ertrag 2016 aus der WP S2 und 2017 aus dem LNS
[e] Daten Ertrag 2016 aus der WP S1, 2017 aus der WP S2 und 2018 aus dem LNS

Toleranz/Resistenz (neben Rizomania)
[1t] =Heterodera tolerant
[1r] =Heterodera resistent
[2] = Ditylenchus tolerant
[3] = **nicht** resistent gegen Rhiz.