Information zu Getreideherbiziden für die Frühjahrsanwendung 2020

Teil I: Mittel gegen Unkräuter und Ungräser

Präparat	Wirkstoffe und -konzentration (g/l bzw. kg)	HRAC-Wirk-gruppe	Maximale Aufwand-menge / ha	Kosten €/ha 1)	Anwendung in Kultur: (kulturspezifische Aufwandmenge beachten)	BBCH-Stadium	Wirkung auf Leitunkräuter /-ungräser: Ackerfuchs-schwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Weidel-gras	Trespe	Quecke	Flug-hafer	Ehren-preis	Kamille	Klatsch-mohn	Kletten-labkraut	Knöterich	Korn-blume	Ausfall-Raps	Stief-mütterchen	Storch-Schnabel	Taub-nessel	Vogel-miere
Atlantis Flex	Mesosulfuron 47 + Propoxycarbazone 68	B	200 - 330 g + 0,6 - 1,0 l FHS	38 - 62	WW,WR,WT,WD,DI	21 - 32	●*	●*	●	●	◕	◑	●	◔	◑	◔	◔	◔	◔	●	◔	◔	◑	◕*
Atlantis Komplett = Atlantis OD + Husar OD	Mesosulfuron 10 + Iodosulfuron 2 + Iodosulfuron 100	B	1,0 l + 0,08 l	63	WW,WT	13 - 32	●*	●*	●	●	◑	○	◕	◕	●	◕	●	●	◔	●	◕	◑	●	●*
Attribut	Propoxycarbazone 700	B	60 - 100 g	28 - 46	WW,WR,WT,DI	13 - 29	◑*	●	◑	◑	◕	◕	◔	○	○	◔	◔	○	○	◑	○	◔	○	○
Avoxa	Pinoxaden 33 + Pyroxsulam 8	A + B	1,35 - 1,8 l	43 - 58	WW,WR,WT	13-32	●*	●*	◑	●	◕	◑	●	◕	◕	◔	◕	◕	○	●	◕	◑	◕	●*
Axial 50	Pinoxaden 50	A	0,9 - 1,2 l	36 - 48	WW,WG,WR,WT,WD,DI, SW,SG,SD	13 - 39	◕*	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Axial Komplett	Pinoxaden 45 + Florasulam 5	A	1,0 - 1,3	42 - 55	WW,WG,WR,WT SW,SG,SD	13 - 29	◕*	●	○	●	○	○	●	○	●	●	●	◑	●	●	○	◑	◔	●*
Broadway	Pyroxsulam 68 + Florasulam 23	B	130 - 220 g + 0,6-1,0 l FHS	38 - 65	WW,WR,WT,WD, DI, E SD	12 - 30 (32)	◕*	●*	◑	●	◕	◑	◕	◕	●	●	●	●	◕	●	◕	●	◑	●*
Husar Plus + Mero	Iodosulfuron 50 + Mesosulfuron 8	B	0,2 l + 1,0 l 0,15 l + 0,75 l	40 30	WW,WR,WT,DI SW, SG, SD	13 - 32 13 - 30	◔	●*	●	●	○	○	◕	◑	●	◕	●	●	◔	●	◕	◑	●	●*
Sword	Clodinafop 240	A	0,25 l	41	WW,WR,WT,WD	21-31	◕*	◔	◔	◑	○	○	◕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Traxos	Clodinafop 25 + Pinoxaden 25	A	1,2 l	45	WW,WR,WT	13 - 31	◕*	●	○	●	○	○	◕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Die Einstufung der Herbizide erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen und Standardanwendung der Mittel.

(...) Zulassung abgelaufen, Zulassungsverlängerung wird erwartet.

*) Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen möglich

1) Preise nach aktueller Handelsliste für Großgebinde, ohne Mehrwertsteuer, Stand 2019

HRAC-Wirkgruppe: Gleicher Buchstabe = gleiche biochemische Wirkung = gleiches Resistenzrisiko bei Ungräsern

BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 13 = 3. Blatt, 29 = Bestockungsende

Bindend für die Anwendung ist die Gebrauchsanleitung der einzelnen Präparate!

Symbolerklärung: ● sehr gute ◕ gute ◑ mittlere ◔ geringe ○ keine Wirkung; FHS = Formulierungshilfsstoff

WW = Winterweizen, WG = Wintergerste, WR = Winterroggen, WT = Wintertriticale, WH = Winterhafer, WD = Winterdurum bzw. Winterhartweizen, DI = Dinkel, E = Emmer

SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale, SH = Sommerhafer, SD = Sommerdurum bzw. Sommerhartweizen

Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz

Herbologie / © K. Gehring, S.Thyssen

Stand: Januar 2020