

ÜBERSICHT 2: WIRKUNG, MENGEN UND RESISTENZKLASSEN WICHTIGER KARTOFFELFUNGIZIDE

Mittel	Wirkstoffe ¹⁾	FRAC-Code ²⁾	Aufwandmenge ³⁾ kg/l je ha	Behandlungen max.	Wartezeit	Alternariawirkung ⁴⁾	Krautfäulewirkung (Spritzabstand 7 Tage) ⁴⁾
lokalsystemische Fungizide							
Acrobat Plus WG	Mancozeb + Dimethomorph	40	(1,8–)2,0	5	14	•••	•••
Areva MZ	Mancozeb + Dimethomorph	40	(1,8–)2,0	5	7	•••	•••
Valis M	Valifenalate + Mancozeb	40	(2,2–)2,5	4	7	•••	•••
Valbon	Mancozeb + Benthiavalicarb	40	(1,5–)1,6	6	7	•••	•••
Revus Top	Mandipropamid + Difenconazol	40	0,6	3	3	•••(•)	•••
Banjo forte	Fluazinam + Dimethomorph	29, 4	1,0	4	7		•••
Carial Flex	Cymoxanil + Mandipropamid	27	0,6	6	7		••(•)
Video	Mancozeb + Cymoxanil	27	2,0	4	14	•••	•••
Curzate M WG	Mancozeb + Cymoxanil	27	2,3	3	14	•••	•••
Reboot	Cymoxanil + Zoxamide	22, 27	0,45	6	7	••	•••
Tanos⁵⁾	Cymoxanil + Famoxadone	11, 27	(0,5–)0,7	2	14	•••	•••
Cymbal flow	Cymoxanil	27	0,5	6	7		•••
Dagonis	Fluxapyroxad + Difenconazol	7, 3	0,75	4	7	•••	
Narita	Difenconazol	3	0,5	1	14	•••(•)	
Ortiva⁶⁾	Azoxystrobin	11	0,5	3	7	•••	
Signum⁶⁾	Pyraclostrobin + Boscalid	7	0,25	4	3	•••	
Kontaktfungizide							
Dithane Neo Tec	Mancozeb	M 03	1,8	6	7	•••	••
Polyram WG	Metiram	M 03	1,8	5	14	•••	••
Tridex	Mancozeb	M 03	2,0	8	7	•••	••
Kontaktfungizide mit sporenabtötender Wirkung							
Electis	Mancozeb + Zoxamide	22	1,8	3	7	•••	••(•)
Shaktis	Mancozeb + Amisulbrom	21	2,0	6	7	•••	••
Ranman Top	Cyazofamid	21	0,5	6	7		•••
Shirlan/Winby/ Terminus/Carneol/ Lotus-Nadoo 500/ Bani/Ohayo	Fluazinam	29	0,4	8	7		•••
systemische Fungizide							
Infinito	Fluopicolide + Propamocarb	43	(1,2–)1,6	4	14		••••
Proxanil Extra	Cymoxanil + Propamocarb + Fluazinam	27, 43	2,0+0,4	4	14		•••
Proxanil + Ranman Top	Cymoxanil + Propamocarb + Cyazofamid	21, 27, 43	2,5+0,5	4	7		••••
Zorvec Enicade NZEB	Oxathiapiprolin + Mancozeb	49	0,15+1,5	4	7	•••	••••

Wirkung: •••• = sehr gut, •••(•) = gut bis sehr gut, ••• = gut, •• = befriedigend, • = nicht immer befriedigend; 1) Zulassung und Wirkstoffgehalte siehe aktuelle PAPI-Liste; 2) gleiche Nummerierung = gleicher Wirkmechanismus, d. h. wechseln Sie spätestens nach zwei Einsätzen mit derselben Nummerierung auf eine andere Wirkstoffgruppe; 3) Je nach Infektionsdruck zu variieren; 4) Einstufung nach eigenen Erfahrungen bei passender Witterung; 5) in Kombination mit 0,2 bis 0,3 l/ha Fluazinam erhöht sich die Alternaria-Wirkung; 6) auf Resistenzstandorten kann die Wirkung abfallen; Beachten Sie bei allen Produkten die Zulassungen, Packungsbeilagen und Vorgaben Ihrer Vermarkter! Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Von vielen Produkten gibt es generische Präparate. top agrar; Quelle: Beratungsdienst Kartoffelanbau Heilbronn e. V.

△ Achten Sie bei der Mittelauswahl auch auf den FRAC-Code und wechseln Sie die Wirkstoffe – das beugt Resistenzen vor.