

Sortenleistung SV-N 2019-2021

Nematoden tolerante/resistente Sorten

mit Nematoden-Befall

Sorten	Vertrieb	Prüf- jahre	relativer Ertrag und relative Qualität (mit Fungizid) ^a									Blattkrankheiten				FA rel.	Schosser Anz./ha	
			RE	ZG	ZE	AmN	SMV	BZE	BZE-Konstanz			BZE-Verlust %	Toleranz	Anfälligkeit 1-9				
									2019	2020	2021			Cerc.	Mehl.			
Thaddea KWS ¹	KWS	3	108,2	95,7	103,4	105,6	103,9	102,6	101,2	100,7	105,9	keine unterschiedlichen Fungizidbehandlungen durchgeführt			3,5	1,4	99,1	4
Lunella KWS ¹	KWS	3	104,8	98,6	103,2	108,4	103,0	102,8	102,8	102,6	103,1				3,2	1,4	100,0	42
Feliciana KWS ¹	KWS	3	107,9	95,1	102,4	110,7	108,1	101,2	99,6	100,5	103,5				3,0	1,4	98,7	5
Caprianna KWS ¹	KWS	1WP NT + 2	102,6	99,3	101,8	127,3	105,2	101,4	102,0	103,1	99,1				3,5	2,5	100,2	7
BTS 7300 N¹	BTS	3	102,2	99,3	101,4	95,6	97,5	101,5	101,5	101,4	101,6				3,2	1,8	99,1	12
Lisanna KWS¹	KWS	3	100,3	100,2	100,5	102,3	100,6	100,5	100,2	100,7	100,7				2,8	1,6	101,1	11
BTS 6975 N ¹	BTS	2 WP NT + 1	101,5	98,8	100,2	100,8	104,2	99,8	97,8	100,1	101,4				2,1	1,5	k.A. ^c	13
Annarosa KWS ¹	KWS	3	99,3	100,7	100,1	109,3	102,2	100,0	99,5	99,7	100,9				2,8	1,5	99,6	23
Kakadu ¹	SV	2 WP NT + 1	102,2	97,5	99,6	97,9	102,0	99,2	99,3	99,8	98,4				2,5	1,4	k.A. ^c	3
Fitis ¹	SV	2 WP NT + 1	99,6	99,3	98,9	109,6	100,8	98,8	97,5	97,4	101,4				2,7	2,0	k.A. ^c	3
BTS 440¹	BTS	3	97,5	100,5	98,1	102,2	101,9	98,0	98,4	97,9	97,7				2,5	1,5	99,8	14
Blandina KWS ¹	KWS	2 WP NT + 1	102,5	95,3	97,7	116,7	109,7	96,5	91,9	97,8	99,9				1,8	2,1	k.A. ^c	22
Orpheus ¹	STR	1 WP NT + 2	94,6	102,5	97,0	94,2	100,5	97,2	97,3	98,6	95,6				2,8	2,2	101,6	12
Racoon ¹	SV	3	95,5	101,3	96,8	128,1	106,9	96,5	96,9	96,4	96,2				3,0	2,5	103,4	18
Kleist ¹	STR	3	95,7	98,4	94,3	112,1	102,8	93,9	94,8	92,3	94,7				3,0	2,5	101,3	22
BTS Smart 9245 N ¹	BTS	2 WP NT + 1 SV-N	94,8	98,9	93,8	116,6	101,6	93,6	95,0	k.A.	93,2				2,9	2,2	k.A. ^c	214
Aluco ¹	SV	3	90,5	102,7	93,1	112,4	100,9	93,3	95,0	93,4	91,4			3,1	1,7	102,9	6	
Smart Thekla KWS ¹	KWS	2 WP NT + 1 SV-N	87,9	101,2	89,1	130,6	105,4	88,9	k.A.	k.A.	91,8			3,5	2,2	k.A. ^c	27	

Quelle: IFZ verändert

^a 100 = Verrechnungsmittel der Sorten Lisanna KWS, BTS 440, BTS 7300 N^c Felddaufgang nur einjährige Daten (daher keine Ausweisung)Toleranz/Resistenz (neben Rizomania)

1 = Heterodera tolerant