

Herbizide in Ackerbohnen und Futtererbsen

| Ackerbohne | Futtererbse | Anwendungszeitpunkt (BBCH) | Wirkstoffklasse (HRA C) | Wirkstoff | Gehalt in g/l oder g/kg | Produkt Zulassung bis: | Menge /ha | Gewässer | | | | Saumstruktur | | sonstige Auflagen bei der Anwendung | Fuchsschwanz | Windhalm | Hirse | Quecke | Knöterich | Klette | Kamille | Gänsefuß | Taubnessel | Stiefmütterchen | Ehrenpreis | Vogelmiere | Nachtschatten | Wartezeit in Tagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---|------|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------|-------|--------|-----------|--------|---------|----------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------|--------------|--|----|------|------|------|------|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Hang > 2 % | Abstand in m bei einer Abdriftminderung von | 0% | 50% | 75% | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | Abstand in m | 20 m Spritzbreite mit einer Abdriftminderung von | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 32 | Aclonifen | 600 | Bandur 31.12.2024 | 4,0 l | 10 | n.e. | 15 | 10 | (5)* | 5 | 75% | NW800: keine Anwendung auf drainierten Flächen im Zeitraum 1. Nov. bis 15. März | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 15 | Prosulfocarb | 800 | Boxer/Filon 31.10.2023 | 4,0 - 5,0 l | - | n.e. | n.e. | n.e. | * | - | 90% | NT145 NT146 NT170 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 13 | Clomazone | 360 | Centium 36 CS 31.12.2025 | 0,25 l | - | * | * | * | * | - | 75% | NT127 Temperaturabhängigkeit; NT149 Aufzeichnungen | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 32 13 | Aclonifen Clomazone | 500 30 | Novitron DamTec 31.12.2024 | 2,4 kg | 10 | n.e. | 20 | 15 | (5)* | 5 | 75% | NT127 Temperaturabhängigkeit ; NT149 Aufzeichnungen | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 3 15 | Pendimethalin Dimethenamid-P | 250 212,5 | Spectrum Plus 31.12.2027 | 4,0 l | 20 | n.e. | n.e. | n.e. | (5)* | 5 | 90% | NG405 keine Anwendung auf drainierten Flächen NT145 NT146 NT170 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | NA; 10 - 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 l | 20 | n.e. | n.e. | n.e. | (5)* | 5 | 90% | NT145 NT146 NT170 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| x | x | VA | 3 | Pendimethalin | 455 | Stomp Aqua 30.06.2023 | 4,4 l | - | n.e. | n.e. | n.e. | 10 | 5 | 90% | NT145 NT146 NT170 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,5 l | 5 | n.e. | n.e. | n.e. | (5)* | 5 | 90% | NT145 NT146 NT170 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F |
| | | NA | 3 | Pendimethalin | 455 | Stomp Aqua 30.06.2023 | 3,0 l | - | n.e. | n.e. | n.e. | (5)* | 5 | 90% | NT145 NT146 NT170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiele: Präparatmischungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | VA | 15 3 | Prosulfocarb Pendimethalin | | Boxer + Stomp Aqua | 3,0 l 2,0 l | Auflagen und Anwendebestimmungen siehe oben bei Einzelprodukten | Auflagen und Anwenbestimmungen siehe oben bei Einzelprodukten | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | | | | | | | | |
| x | x | VA | 13 3 | Clomazone Pendimethalin | | Centium 36 CS + Stomp Aqua | 0,25 l + 2,5 l | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F |
| x | x | VA | 13 32 | Clomazone Aclonifen | | Centium 36 CS + Bandur | 0,2l + 3,0l | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F |
| x | x | VA | 32 32/13 | Aclonifen Aclonifen/Clomazone | | Bandur + Novitron DamTec | 1,0 l + 2,4 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F |
| Graminizide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | 13-39 | | Propaquizafop | 100 | Agil S 30.11.2024 | 0,75 l | - | * | * | * | * | - | | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | 11-51 | 1 | Cycloxydim | 100 | Focus Aktiv Pack 31.12.2025 | 2,0 - 2,5 l + 1 l Dash | - | * | * | * | * | - | 50% | | | | ○ | | | | | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-50 | | | | | 0,8 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | 34-51 | 1 | Fluazifop-P-butyl | 128 | Flua Power 31.12.2024 | 1,25 l | - | * | * | * | * | 5 | 75% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | 32-50 | | | | | 1,6 l | - | * | * | * | * | 5 | 90% | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | 11-51 | 1 | Fluazifop-P-butyl | 107 | Frequent Max 31.12.2024 | 1,0 l | - | * | * | * | * | - | 75% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | -50 | | | | | 2,0 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | -51 | 1 | Fluazifop-P-butyl | 107 | Fusilade MAX 31.12.2024 | 1,0 l | - | * | * | * | * | - | 50% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | -51 | | | | | 2,0 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | 11-39 | 1 | Quizalofop-P | 46,3 | GRAMFIX/ Targa Super 30.11.2024 | 1,5 | - | * | * | * | * | - | 50% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,5 | - | * | * | * | * | - | 75% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | 11-39 | 1 | Quizalofop-P ethyl | 50,00 | Leopard 30.11.2023 | 1,25 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,5 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | NA | 1 | Quizalofop-P tefuryl | 31,81 | Panarex 30.11.2024 | 1,25 l | - | * | * | * | * | - | 75% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,25 l | - | * | * | * | * | - | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | 14-39 | 1 | Clethodim | 240 | Select 240 EC + Radiumix 31.12.2024 (nur in Beständen zur Saatguterzeugung) | 0,5 l + 1,0 l | - | * | * | * | * | 5 | 75% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | 1,0 l + 1,0 l | - | * | * | * | * | 5 | 90% | | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |

n.e. = nicht erlaubt; * = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern, in NRW gilt ab Böschungsoberkante ein Abstand von 10 m oder von 5 m, wenn eine geschlossene, ganzjährig begründete Pflanzendecke vorhanden ist.; ² = nur in Beständen zur Saatguterzeugung

Ann.: ○ Leerer Kreis = keine Wirkung; ◐ ¼ Kreis = Teilwirkung; ◑ ½ Kreis = Mittlere Wirkung; ◒ ¾ Kreis = gute Wirkung; ● Voller Kreis = sehr gute Wirkung; Preisliste MyAgrar Feb. 23