

Grünlandherbizide

Einsatz-/ Anwendungs- Zeitpunkt	Anwendungs- bedingungen					HRAC- Einstufung: Wirkklasse	Wirkstoff	Gehalt  g/l/kg	Mittel  Zulassung bis:	Menge  ha	Indikation	Wartezeit in Tagen	Ampfer	Bärenklau	Binsen	Brennnessel	Disteln	Hahnenfuß	Hellerkraut	Hirtentäschel	Hufblättrich	Jakobskreuzkraut	Löwenzahn	Schachtelhalm	Schafgarbe	Vogelmiere	Wegerich	Wiesenkerbel	Kleeschonung
	Frühjahr	Sommer	Herbst	kühl (ab 10 °C)	warm (bis 25 °C)																								
während der Vegetationsperiode	☉	●	☉	☉	●	4	Dicamba	480	<b>Banvel 480 S/ Mais Banvel fl.</b> 31.12.2023	<b>1,0</b>	zweikeimblättrige Unkräuter	14	●			☉									☉	●	☉		
während der Vegetationsperiode; Frühjahr bis Herbst			●	●	☉	2	Thifen- sulfuron	480,6	<b>Harmony SX/ Lupus SX</b> 30.06.2023	<b>45 g</b>	Ampfer- Arten	14	●	○	○	☉	☉	☉		●	☉	☉	☉	☉	●	☉	☉		ja
März bis September (nicht im Ansaatjahr)	☉	●	●	●	●	4 4 4	Fluroxypyr + MCPA + Clopyralid	50 + 233 + 28	<b>Kinvara</b> 30.09.2023	<b>3,0 l</b>	Stumpfpblättriger Ampfer	14	●	☉	☉	☉	☉	☉		●	☉	☉	●		☉	●	☉		
während der Vegetationsperiode	●	●	●	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Lodin</b> 31.12.2025	<b>2,0 l o. Splitting 2 x1 l</b>	einjährig, zweikeimblättrige Unkräuter, Ampfer	7	●	☉		☉			●	☉			●		☉	●	☉		
während der Vegetationsperiode (Mai- August)		●		●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Flurostar 200</b> 31.12.2025	<b>1,8 l</b>	Ampfer, Große Brennnessel; Wiesen- Löwenzahn	7	●	☉		☉			●	☉			●		☉	●	☉		
während der Vegetationsperiode (nicht im Ansaatjahr)	●	●	●	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Tandus</b> 31.12.2025	<b>2,0 l</b>	zweikeimblättrige Unkräuter	7	●	☉		☉			●	☉			●		☉	●	☉		
Herbst während der Vegetationsperiode (nicht im Ansaatjahr)			●	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Waran</b> 21.12.2025	<b>2,0 l</b>	Ampfer zweikeimblättrige Unkräuter	7	●	☉		☉			●	☉			●		☉	●	☉		
während der gesamten Vegetationsperiode	●	●	●	●	●	4 4	Fluroxypyr + Triclopyr	150 150	<b>Ranger</b> 15.12.2025	<b>2,0 l</b>	Ampfer- Arten, Wiesen- Löwenzahn Brennnessel	7	●	☉	☉	●	☉	☉	●	☉	☉	☉	●		☉	●	☉		
während der Vegetationsperiode	●	●	●	●	●	4 4	Fluroxypyr + Aminopyralid	100 + 30	<b>Simplex</b> 31.12.2025	<b>2,0 l</b>	zweikeimblättrige Unkräuter	7	●	☉		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	☉	
März bis Oktober	☉	●		☉	●	4	2,4 D	500	<b>U 46 D-Fluid</b> 31.12.2031	<b>1,5 l</b>	Spitzwegerich	14	☉		●		☉	☉		●			●		☉		●		
Mai / August		●		☉	●	4	MCPA	500	<b>U 46 M-Fluid</b> 31.10.2024	<b>2,0 l</b>	zweikeimblättrige Unkräuter	14	☉		☉		●	●	☉	●		☉	●	☉		●			(ja)
<b>Herbizide (nur im Ansaatjahr)</b>																													
Frühjahr bis Sommer BBCH 13-16	●	●		●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Flurostar 200</b> 31.12.2025	<b>0,75 l</b>	einjährig, zweikeimblättrige Unkräuter	7	☉						●	☉			☉	☉	☉	●			
Frühjahr oder Herbst ab BBCH 13	●	●	☉	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Lodin</b> 31.12.2025	<b>0,75 l</b>	einjährig, zweikeimblättrige Unkräuter	7	☉						●	☉			☉	☉	☉	●			
Frühjahr oder Herbst ab BBCH 13	●	●	☉	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Tandus</b> 31.12.2025	<b>0,75 l</b>	zweikeimblättrige Unkräuter	7	☉						●	☉			☉	☉	☉	●			
Frühjahr während der Vegetationsperiode (im Ansaatjahr)	●	●	☉	●	●	4	Fluroxypyr	200	<b>Waran</b> 21.12.2025	<b>0,75 l</b>	Ampfer einjährig, zweikeimblättrige Unkräuter	7	☉						●	☉			☉	☉	☉	●			

<sup>1</sup> länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern, in NRW gilt ab Böschungsoberkante ein Abstand von 10 m oder von 5 m, wenn eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist.  
ne = Anwendung nicht erlaubt; NW 800 Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März